

## PROVA DE FISIOTERAPIA

**CANDIDATO:** William Cavalcante Fernandes

**INSCRIÇÃO:** 83

SOLICITA REVISÃO DA RESPOSTA CONSTANTE DO GABARITO OFICIAL PARA A QUESTÃO 01:

- 1) Com o objetivo de evitar vícios de marcha no paciente hemiplégico, os músculos que devem ser primeiramente trabalhados são:
  - a) Flexores da coxa, flexores da perna e dorsiflexores do pé.
  - b) Extensores da coxa, extensores da perna e dorsiflexores do pé.
  - c) Flexores da coxa, extensores da perna e dorsiflexores do pé.
  - d) Extensores da coxa, flexores da perna e dorsiflexores do pé.
  - e) Extensores da coxa, flexores da perna e inversores do pé.

Resposta correta do gabarito: A

### TRANSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA DO CANDIDATO

“De acordo com Bobath (2001) a marcha Hemiplégica pode ser classificada (com Hiperextensão do joelho) pela combinação de 03 fatores: 1º - um decréscimo da flexão de quadril no momento do choque com do calcanhar na fase de apoio e uma redução da extensão do quadril na fase de propulsão. 2º - Uma redução da amplitude de movimentos de extensão do joelho na fase de balanço e apoio da marcha, devido uma hiperatividade do membro inferior. 3º - Um aumento da flexão plantar durante o choque do calcanhar assim como um decréscimo desse movimento na fase de propulsão. O paciente com hemiplegia compensa o empurrão para trás da tíbia inclinando anteriormente a pelve e ou fazendo uma flexão para frente do quadril (Umpherd, 1994). A ação do músculo TFL é abdução e flexão do quadril e tendência a girar o quadril internamente à medida que se flexiona (Thomeson, 1997)”.

### PARECER DA COMISSÃO: ANULAÇÃO DA QUESTÃO 01

#### JUSTIFICATIVA:

Considerando muitos questionamentos acerca da elaboração, interpretação e resposta da questão 01 de conhecimentos específicos da prova para fisioterapia, a comissão organizadora da seleção resolveu por **ANULÁ-LA**.